

कोविड-19 से होने वाली मौतों में नेक्रोटोसिस भी रहा एक कारण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआईटी) इंदौर में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के कारणों पर किए जा रहे शोध में पता चला है कि इस संक्रमण से हुई मौतों में नेक्रोटोसिस भी एक कारण था। दरअसल, सीरम फेरिटिन में वृद्धि कोविड-19 रोगियों की मौतों का प्राथमिक कारण थी, जो कि फेरोटोसिस के कारण बन रही थी।

आइआईटी इंदौर द्वारा किए गए शोध में सामने आई वजह

वहीं कुछ मृत्यु ऐसी भी हुई, जिनमें सीरम फेरिटिन नहीं बढ़ रहा था। इसी के चलते कोरोनाकाल में होने वाली मृत्यु की वजह का पता लगाने के लिए यह अध्ययन किया गया।

बायोसाइंसेज और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट

प्रोफेसर और इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता डा. हेमचंद्र झा ने कहा कि सीरम फेरिटिन कोविड-19 के अत्यंत घातक होने जाने की एक महत्वपूर्ण वजह है। फेरोटोसिस द्वारा सेल डेथ से भी जुड़ा है। यह अध्ययन कम सीरम फेरिटिन रोगियों से जुड़ी सेल डेथ की क्रियाविधिक समझ भी उपलब्ध करा सकता है।